



Lésions vaginales suite à une radiothérapie, chimiothérapie ou chirurgie gynécologique
Lésions vaginales suite à un accouchement (dyspareunie du post-partum)

Contre-indications :

En cas d'hypersensibilité connue ou suspectée à l'un ou à l'ensemble des composants du produit.

Interactions

Ne pas utiliser en association avec des dispositifs médicaux ou médicaments à usage vaginal sans avoir préalablement consulté un médecin.

Précautions d'emploi

L'utilisation prolongée de tout produit à usage local peut provoquer une sensibilisation ; dans ce cas il est conseillé d'interrompre le traitement et consulter votre médecin pour mettre en route un traitement approprié. Ne pas utiliser sans avis médical chez les enfants de moins de 15 ans. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux.

Grossesse et allaitement

La sécurité de l'utilisation de IALUGYN ovules vaginaux pendant la grossesse ou en cours d'allaitement n'a pas été démontrée. Dans ces conditions, il est conseillé de consulter votre médecin.

Comment utiliser IALUGYN ?

• Post-mycose vaginale

Prendre un traitement anti-infectieux adapté puis utiliser en relais immédiat IALUGYN ovules vaginaux à raison d'un ovule tous les soirs pendant 5 à 10 jours en fonction de la gravité des lésions.

• Sécheresse vaginale

Deux ovules par semaine en continu (cure de 5 semaines à renouveler si nécessaire).



• Lésions traumatiques

Un ovule par jour pendant 5 à 10 jours selon l'étendue des lésions.

Mode et durée d'utilisation :

Introduire profondément l'ovule dans le vagin le soir au coucher, de préférence en position allongée. La façon la plus facile de procéder est de vous allonger sur le dos, les genoux repliés et écartés.

La durée d'utilisation dépend de la durée des symptômes, le cas échéant, IALUGYN ovules vaginaux peut être utilisé pendant des périodes prolongées. IALUGYN peut être utilisé avec des préservatifs.

Comment conserver IALUGYN ?

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte ou si le conditionnement est ouvert ou endommagé.

A conserver dans le conditionnement soigneusement fermé, à l'abri de la lumière et de la chaleur, de préférence ne dépassant pas 25 °C.

Conseils pratiques :

Vous souffrez de mycoses vaginales :

- Porter des sous-vêtements en coton et des pantalons confortables.
- Éviter le port prolongé de maillots de bain synthétiques.
- Préférer les serviettes hygiéniques aux tampons.
- Changer régulièrement les serviettes hygiéniques ainsi que les tampons et éviter les protège-slips en dehors des règles.
- Éviter les douches vaginales et le savon lors de la toilette intime.
- Toilette avec un savon à pH neutre ou alcalin.
- S'essuyer de l'avant vers l'arrière.
- Éviter les rapports sexuels pendant les mycoses (sinon utiliser un préservatif).
- Limiter le stress et la fatigue.
- En cas de prise d'antibiotiques, prévenir votre médecin pour un éventuel traitement préventif.

Vous souffrez de sécheresse vaginale.

- Préférer les serviettes hygiéniques aux tampons.
- Éviter les douches vaginales et le savon lors de la toilette intime.
- Utiliser un gel lubrifiant pendant les rapports sexuels et préférer les préservatifs lubrifiés.
- Limiter le stress et la fatigue.
- Éviter le tabac et l'alcool.

Date de révision de la notice : Février 2025



Propriétés :

Partie intégrante de la substance fondamentale du derme, l'acide hyaluronique joue un rôle essentiel dans la cicatrisation des plaies :

- Restructuration du site lésé.
- Activation des cellules cicatrisantes.
- Action sur la vascularisation.

Grâce à sa capacité de rétention d'eau, il forme, même à de faibles concentrations, un gel très volumineux. Ces énormes coussins remplis d'eau sont capables de résister à des pressions considérables et de diminuer les frottements. Sa viscosité permet également une bonne protection contre le passage des agents infectieux comme les bactéries.

Agent antioxydant, il protège la muqueuse de l'agression des radicaux libres.

Une cicatrisation qui respecte l'écosystème vaginal :

- IALUGYN ovules vaginaux agit sur toutes les phases du processus de cicatrisation (activation de la détersion et de la reconstitution épithéliale, minimisation des phénomènes de fibrose).
- Ne contient pas d'hormones, ni d'antiseptique.
- Protège et favorise la reconstruction de la flore physiologique.
- La muqueuse, régénérée, redevient favorable à la flore physiologique.

Composition :

Acide hyaluronique sel sodique 5 mg, glycérides semi-synthétiques solides, extrait lipidique de Centella asiatica 60 mg, extrait lipidique de Calendula officinalis 60 mg, extrait lipidique d'Aloe vera 60mg, huile essentielle de Melaleuca 2 mg, BHT q.s.p. 1 ovule.

Indications :

IALUGYN ovules vaginaux est proposé pour favoriser la cicatrisation des lésions vulvo-vaginales de toute origine :

Les mycoses vaginales

Cette pathologie touche 3 femmes sur 4. Les champignons font partie intégrante de l'écosystème vaginal. Néanmoins, certaines situations peuvent conduire à une prolifération excessive de ces champignons qui entraîne des lésions.

Les infections mycosiques (mais également bactériennes) génèrent des plaies vaginales parfois douloureuses.

L'acide hyaluronique contenu dans IALUGYN ovules vaginaux favorise la cicatrisation vaginale locale.

Il existe des facteurs favorisants les mycoses vaginales comme un traitement antibiotique, des variations hormonales, l'usage de savons acides, un diabète sucré, l'abus de toilette intime...

Le traitement repose sur un antifongique, relayé ensuite par un cicatrisant vaginal comme IALUGYN ovules vaginaux.

La sécheresse vaginale

Près d'une femme sur 6 se plaint de sécheresse vaginale, source d'inconfort lors des rapports sexuels et d'infections urinaires.

Elle est souvent liée soit à une inflammation locale (infection, champignon, radiothérapie) soit à une variation hormonale (ménopause, grossesse, contraceptions hormonales inadéquates...).

Sa prise en charge repose sur le traitement de la cause et sur l'administration locale d'agents protecteurs, hydratants et lubrifiants comme IALUGYN ovules vaginaux.

Lésions traumatiques

Rapports douloureux ou dyspareunie (post-partum,...)
Lésions vaginales suite à une conisation, une biopsie ou une coloscopie

ماهي الحالات التي لا يستعمل فيها ايبالوجين ؟

تشاد الاستيطارات

حساسية معروفة أو يشتبه بوجود حساسية لإحدى مكونات الدواء

التفاعلات

يمنع استعمال ايبالوجين مع الإيمبيمية الطبية أو أدوية للاستعمال الموهلي دون استشارة الطبيب.

احتياطات الاستعمال

أي مستحضر يستعمل لفترة طويلة عبر السبل الموضعي قد يسبب حساسية، وفي هذه الحالة يستحسن وقف العلاج واستشارة الطبيب. لهذه العلاج المناسب لا يستعمل دون استشارة طبية للإطفال دون 15 سنة. يترك بعيدا عن متناول و نظر الأطفال، لا يبلع. تجنب ملامسته العينين.

الحمل و الرضاعة

لم يتم إجراء دراسات الاستعمال الإيمبيمن لتحميل مهلية خلال فترة الحمل أو الرضاعة.

في هذه الحالة يستحسن استشارة الطبيب.

كيف يستعمل ايبالوجين ؟

• ما بعد الفطار المهليل

استعمل علاج مناسب للفطريات ثمر استعمال فوراً تصميبة واحدة من ايبالوجين.
تحميل مهلية في المساء مدة 5 إلى 10 أيام حسب مدة الإصابة.

تصالح مهلية

فاكت تكت تعانين من الفطار المهليل

- عليك بإزالة ملابس داخلية فضيلة وسراويل مرحة
- تجنبي ارتداء ملابس مسامة استيطامية لمدة طويلة
- يفضل استعمال القفولة الصحية على السداقة القطنية
- يفضل تغيير القفولة الصحية وكذلك السداقة القطنية بانتظام ، تجنبي ارتداء القفولة الصحية اليومية خارج الساعة الشورية
- تجنبي الدش الموهلي والصابون عند النظافة الشخصية
- استعملي صابون ذو تونين كيميائي معتدل أو قروي

استحي من الإمبار إلى الخلف

تجنبي الجماع أثناء العدوى الفطرية (أو استعمال الواقي الذكري)

الحد من الإجهاد والتعب

عند تناول المضادات الحيوية، يجب إعلام الطبيب ليصف لك علاج وقائي

إذا كنت تعانين من جفاف المهليل (نقص تشحير المهليل)

- الحد من الإجهاد والتعب
- عند تناول المضادات الحيوية، يجب إعلام الطبيب ليصف لك علاج وقائي
- تجنبي الدش الموهلي والصابون عند النظافة الخاصة
- استعملي مستحضر يساعد على التزوية أثناء الجماع ويفضل استعمال واقي ذكري، لزج
- الحد من التدخين و تعاطي المشروبات الكحولية

تاريخ مراجعة الشرة: فيفري 2025.

تبادر رابع الاحتياطات اللازمة للاستعمال

الحد الأدنى لدرجة الحرارة

تاريخ انتهاء الصلاحية

ننتج

أوباليا فرما (مجمع ريكورداتي) المنطقة الصناعية
قاعة الأندلس 2022 أريانة تونس



تحملين في الإسبوع (علاج لمدة 5 أسابيع إذا لمز الإيمر يمكن معاودة العلاج)



• إصابات مرتجحة:

تحمله واحدة في الإسبوع مدة 5 إلى 10 أيام و ذلك حسب انتشار الإصابة

تحينه مهلية واحدة في المساء أو وفقا لتصالح الطبيب، توضع في صفق المهليل، يستحسن في وضعية مستطيلة.

أسهل طريقة للاستعمال هي الاستلقاء على الظهر، لحي الركبتين و إبعادهما عن بعض.

مدة الاستعمال تعتمد على مدة العدوى، يمكن استعمال ايبالوجين لفترات طويلة.

كما يمكن استعمال ايبالوجين مع الواقي الذكري.

كيف يحفظ ايبالوجين ؟

يجب عدم استعمال ايبالوجين بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على الخلف الخارجي.

يحفظ داخل علبة مغلفة بعيدا عن الضوء و الحرارة و من المستحسن لا تتجاوز 25 درجة مئوية.

خصائص حمض الهيالورونيك

هو جزء من مادة أساسية في نسيج الجلد، تنبع دورا أساسيا في التمر الجروح

- إعادة تكوين الجروح
- تشطيب خلايا الكبد
- فائدة على الزوية العميقة
- يفضل فدرته على ادمصاص الماء، ويكون حمض الهيالورونيك مادة هلامية سبكة المجر حتى في التكرات المتخاطفة.
- الجيوب الضخمة مملوءة بالماء فقدرها على الصمود أمام ضغط هائل وتبسط الاستناك.
- تزوية حمض الهيالورونيك تمنح أيضا بحماية جيدة عند انتقال العدوى مثلا البكتية
- عند الالكسقاء، يعمل على حماية الإشمية المخاطية من تضر الجوار الجرد

يضمن التندب الذي يلي الفطار الإيكولوجي الموهلي

- يعمل ايبالوجين، لتحميل مهلية في كل مراحل التندب (تشظية تشظية والتندب وإعادة ترميم نسيج الجلد، لتقلص ظاهرة الإفراج، لا يتجوى على الهيرويات و لا على مضادات التندب.
- يحسن و يعزز إعادة ترميم النبت الفسيولوجي
- يحميد ترميم الإشمية المخاطية حتى تصبح مناسبة للتفوز الفسيولوجي

التزوية

حمض هيالورونيك ملح الصوديوم 5 مع، للهيديرات حبة نصف مكرية، خلاصة دحية من ستيناد إسكادا 60 مع، خلاصة دحية من الكندالو الفيسالين 60 مع، خلاصة دحية من الإوفافيا 60 مع، زيت أساسي من ما لثاوية 2 مع، بوزيل هيدروكسي التازولين 2 مع، كل لتوصيفة مهلية.

ماهي الحالات التي لا يستعمل فيها ايبالوجين ؟

ايبالوجين لتحميل مهلية يوصف لتعزيز التندب في حالة إصابة ففري مهليل من جميع المصادر:

فطار مهليل

هذا المرض يصيب 3 نساء من أصل 4 الفطريات هي جزء من الفطار الإيكولوجي المهليل، ومع ذلك يمكن في بعض الحالات أن تؤدي إلى زيادة نمو هذه الفطريات مما قد يسبب الإصابة والإزعاج.

الإصابة بالفطريات (قد تكون ناتجة عن البكتيريا) قد تحدث ففوج مهلية يمكن أن تكون مؤلمة.

حمض الهيالورونيك السداقة الفعالة و ايبالوجين لتحميل مهليل تعزيز التندب على مستوى المهليل

هناك عوامل أخرى تعزز الفطار المهليل مثلا العلاج بالمضادات الحيوية، التخثيرات الهورمونية، استعمال 1 صابون الحامضي، داء السكري، الإفراج و النظافة الشخصية.

يعتمد العلاج على مضادات الفطريات، علاج لاحقا بعلاج تشذب المهليل مثلا ايبالوجين لتحميل مهلية

جفاف المهليل (نقص تشحير المهليل)

حسوي لمساحة عش 5 تشحير من صلاصات و أسوس جفاف المهليل، جفاف المهليل يعمل من الجماع عملية غير مريحة كما هو الشال أثناء الإتهابات البولية

تاليا ترتبط بالإتهابات الوضعية (العدوى ، الفطريات ، العلاج الإشعاعي) أو لفطريات هورمونية (أثناء سن اليأس و الحمل، استعمال إسكاد منع الحمل الهورموني غير مائل).

يستند علاج جفاف المهليل على علاج الأسباب و استعمال مستحضرات موضعية تحمي من جفاف المهليل و تحافظ على رطوبة المهليل و تساعد على التزوية مثلا ايبالوجين لتحميل مهلية

إصابات مرتجحة

- الفر لكه الجماع أو عبر الجماع (بعد الولاد).
- إصابات في المهليل بعد استعمال المعوي، استعمال نسيج من المهليل أو تشظي المهليل
- إصابات في المهليل بعد العلاج الإشعاعي، العلاج الكيميائي وجرامة الحوض
- إصابات في المهليل بعد الولادة (نسر الجماع بعد الولاد).