

Tails® 250 mg

Terbinafine
Comprimés sécables

1. QU'EST-CE QUE TALLIS 250 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

COMPOSITION
Principe actif: terbinafine 250 mg (Sous forme de chlorhydrate de terbinafine 281,25 mg)
Excipients : Stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, hypromellose... q.s.p 1 comprimé.

Forme pharmaceutique : Comprimé sécable.
Classe pharmaco-thérapeutique : Agent oral antifongique.
(Code ATC : D01BA2 ; D : dermatologie)

Indication thérapeutique :
Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines infections provoquées par des champignons de la peau et des ongles

• Onychomycoses.
• Dermatomyctoses cutanées (notamment dermatophytie de la peau glabre, kératodermie palmoplantaire, intertrigo interdigital intertrigo).
• Candidoses cutanées.
Lorsque ces deux dernières infections ne peuvent être traitées localement du fait de l'étendue des lésions ou de la résistance aux traitements antifongiques habituels.
La terbinafine administrée par voie orale est inefficace contre le pityriasis versicolor et les candidoses vaginales.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TALLIS 250 mg, comprimé sécable ?

Contre-indications
Ne prenez jamais TALLIS 250 mg, comprimé sécable :
• Si vous êtes allergique à la terbinafine ou à l'un des excipients;
• Si vous avez une maladie grave du foie;
• Si vous avez une maladie grave des reins.
• Si vous avez eu une éruption de pustules blanchâtres avec des rougeurs sur la peau et de la fièvre à la suite d'un traitement par la TALLIS.

Précautions d'emploi
Faites attention avec TALLIS 250 mg, comprimé sécable :
Veuillez informer votre médecin si vous présentez ou avez déjà présenté l'une des situations décrites ci dessous.
Arrêtez immédiatement le traitement et consultez le plus rapidement possible un médecin ou un service d'urgences si vous présentez un des signes suivants : des démangeaisons, une fatigue pouvant être importante, des nausées persistantes, des vomissements, des douleurs sous les côtes à droite, une diminution d'appétit, des urines foncées, des selles décolorées, une jaunisse, de la fièvre, une angine. Avant de commencer le traitement par TALLIS, il est recommandé de faire des tests sanguins pour surveiller la fonction de votre foie. Il vous demandera d'arrêter le traitement en cas de résultats anormaux.
En cas de réactions cutanées graves ont été vues sous terbinafine. Arrêtez immédiatement le traitement et consultez un médecin si vous présentez un décollement de la peau ou des muqueuses avec des cloques au niveau de la bouche, des yeux et des lèvres et/ou un gonflement rapide des boutons avec pus sur une peau rouge, de la fièvre (signes pouvant révéler une réaction grave au niveau de la peau), une éruption sur la peau due à l'augmentation d'un certain type de globules blancs (les éosinophiles).
• Prévenez votre médecin si vous présentez une poussée de psoriasis ou de lupus érythémateux (une maladie de peau liée à une anomalie du système immunitaire).
Si vous avez une fatigue, des saignements inhabituels, des éruptions ou des infections fréquentes, arrêtez le traitement et consultez un médecin.

Dans de rares cas, ce médicament peut provoquer une altération ou une perte du goût (le goût réapparaissant une fois le traitement arrêté). Ne déconseille d'utiliser ce médicament si vous utilisez le goût à des fins professionnelles.
• Prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament si vous avez une maladie du foie. Des cas graves d'insuffisance hépatique ont été rapportés avec la terbinafine. Votre médecin pourra vous prescrire des analyses.
• Prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament si vous êtes atteint de psoriasis ou de lupus érythémateux (une maladie de peau liée à une anomalie du système immunitaire).
• Prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament si vous avez une maladie des reins car ce médicament n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament chez un enfant.

Interactions avec d'autres médicaments
Ne prenez jamais TALLIS 250 mg, comprimé sécable si vous prenez :
• Un médicament utilisé pour traiter des troubles du déficit de l'attention/hyperactivité (atomoxetine).
• Un médicament utilisé dans le traitement de certaines allergies (la méquitazine).
• Un médicament utilisé dans le traitement de certains cancers du sein (le tamoxifène).
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse, sauf avis contraire de votre médecin.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car il seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Alaitement
Ce médicament est déconseillé en cas d'allaitement, sauf avis contraire de votre médecin.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines
Vous devez éviter de conduire ou d'utiliser des machines si vous ressentez des étourdissements.

3. COMMENT PRENDRE TALLIS 250 mg, comprimé sécable ?

Posologie
Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.
Un comprimé par jour.
La durée du traitement dépend du type de la localisation de l'infection.
• Onychomycoses :
La durée de traitement est généralement comprise entre 6 semaines et 3 mois.
• Onychomycoses des mains : une durée de traitement de 6 semaines est suffisante pour la plupart des cas.
• Onychomycoses des pieds : une durée de traitement de 12 semaines est suffisante pour la plupart des cas. Chez quelques patients présentant une croissance des ongles plus lente, une durée de traitement plus longue peut être nécessaire.

Talis® 250 mg

التربينافين
أقراص قابلة للتجزئة

1. ما هو Talis 250 mg قرص قابل للتجزئة وفي أي الحالات يستعمل؟

التركيب:
المادة الفعالة: التربينافين 250 مغ (هيدروكلوريد ترينبافين 281.25 مغ)
المكونات: سترات المغنيسيوم، اللاماتية السيليكا الغروية، سولوز ميكروكريستالين، كروسكارميلوز صوديوم، هيدروكسي بروبيل ميثيل السولوز 281.25 ك.ك. قرص

الشكل الصيدلاني: قرص قابل للتجزئة.
الفئة الصيدلانية: عامل مضاد للفطريات عن طريق الفم.

الاستخدامات العلاجية
يوصى بهذا الدواء في علاج بعض التهابات التي تسببها الفطريات في الجلد و الأظفار:
• قمل صخري
• قمل جلدية (خاصة الفطريات التي تصيب الجلد الأمر، في حالة تقرن الجلد في مستوى الأوتار والأكصمين، مخ بين أصابع الساقين).
• داء المبيضات الجلدية.
عند عدم التمكن من علاج الخمج موضعيا بسبب اتساع الآفات أو مقاومة العلاجات المضادة للفطريات الجلدية.

تربينافين عن طريق الفم غير نافع عند الإصابة بالتهالقية المبرقشة و داء المبيضات المهبلية.

2. ما ينبغي عليك معرفته قبل استعمال Talis 250 mg قرص قابل للتجزئة؟

تحذيرات الاستخدام:
يمنع استعمال Talis 250 mg قرص قابل للتجزئة التالية:
• إذا كنت تعاني من حساسية للتربينافين أو لإحدى المواد المكونة،
• إذا كنت تعاني من قصور كبدى حاد،
• داء الكلى عنى من قصور كبدى حاد،
• إذا كنت تعاني من طلع جلدي من البثورات مع الطلع الجلدي بيضاء والحمى بعد العلاج مع Talis.

تحذيرات الاستخدام
الحرص بشكل خاص مع Talis 250 mg قرص قابل للتجزئة،
• إذا طلييك إذا كنت لديك واحد من الحالات التالية أدناه،
• إذا كنت تعاني من نوال الدواء فوراً أو يستشر الطبيب في أقرب وقت ممكن أو الطوارئ إذا كنت تواجه أي من الأعراض التالية،
• التقيؤ قد يكون مؤشراً،
• الصدور،
• القيء،
• ألم تحت الأضلاع من الجهة اليمنى انخفاض الشهية والول
• الدكن والبثور على نوال ثورن،
• الحصى،
• التهاب الكلى في بدء العلاج مع Talis
• التهابات خلايا نوال العجوز،
• قد يطلب الطبيب اختبارات الدم لرصد وظيفة الكبد. سوف يطلب منك الطبيب عن الوقف عن العلاج في حالة نتائج غير طبيعية.

قد شهدت ردود فعل جلدية خطيرة تحت التربينافين. التوقف عن استعمال الدواء واستشر الطبيب إذا كان لديك تقشير الجلد أو الأوعية المصاحبة مع ظهور بقع في الفم والعينين والشفاة تمتد بسرعة،
• آزار مع القيح على الجلد،
• الحمرار،
• الحمى،
• علامات التي قد تدل على وجود رد فعل على الجلد،
• طفح على الجلد بسبب زيادة في نوع معين من خلايا الدم البيضاء (المحماض).
• آخر طلييك إذا كان لديك مرض الصدفية أو الذئبة الحمامية (حالة الجلد المتعلق بخلل في الجهاز المناعي).

إذا كنت تعاني من تعب، نزيف غير عادي،
• كدمات أو إصابات متكررة،
• التوقف عن استعمال الدواء واستشر الطبيب.
إذا كان لديك أعراض أو علامات من نقص الصفائح الدموية (قد تظهر التجمع إلى التوقف العلاج)،
• نقص الصفائح الدموية،
• استخدام الطعم لأغراض العمل.
• آخر طلييك قبل تناول هذا الدواء إذا كان لديك مرض الكبد. وقد تم الإبلاغ عن بعض الحالات الشديدة من فشل كبدى مع ترينبافين. قد يصف لك الطبيب تحاليل.

• آخر طلييك قبل تناول هذا الدواء إذا كان لديك مرض الصدفية أو الذئبة الحمامية (مرض الجلد الناجم المتعلق بخلل في الجهاز المناعي).
• آخر طلييك قبل تناول هذا الدواء إذا كان لديك مرض في الكلى كما لا ينصح هذا الدواء.
من غير المستحسن استعمال هذا الدواء لدى الأطفال.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى
لا تأخذ TALLIS مع 250 mg قرص قابل للتجزئة إذا كنت تأخذ:
• دواء يستعمل لعلاج العجز اضطراب نقص الانتباه / فرط النشاط (أدوية موكسيتين).
• دواء يستعمل لعلاج بعض أمراض الحساسية (أدوية كيتوم).
• دواء يستعمل في علاج سرطان الثدي معين (تاموكسيفين).
• آخر طلييك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ، قد اتخذت مؤخرًا أو قد تأخذ أي أدوية أخرى.

فترة الحمل
من الأفضل عدم استعمال هذا الدواء أثناء الحمل، ما لم ينصح خلاف ذلك من قبل الطبيب.
إذا اكتشفت أنك حامل أثناء العلاج، واستشارة الطبيب فقط كما أنه يمكن أن تحكم على ضرورة متابعة ذلك.
إسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

لا ينصح هذا الدواء أثناء الرضاعة، إلا إذا نصح بذلك الطبيب.
إسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.
تأثيرات على القدرة على القيادة واستخدام الآلات
يجب تجنب القيادة أو تشغيل الآلات إذا كنت تشعر بالدوار.

3. كيف يستعمل Talis 250 mg قرص قابل للتجزئة؟

في جميع الحالات، يجب النقيذ تماماً بوصفة الطبيب.
قرص واحد في اليوم.
ترتبط مدة العلاج بوعتة الخمج ومكانه.
• قمل صخري: مدة العلاج تتووم عادة بين 6 أسابيع و 3 أشهر.
• قمل أنطار البوبون: مدة العلاج 6 أسابيع كافية في جميع الحالات.
• قمل أنطار الأذن: مدة العلاج 12 أسابيع كافية في جميع الحالات. لدى بعض المرضى الذين يعانون من تباطؤ نمو الأظفار، مدة علاج أطول قد يكون ضروري.
في كثير من الأحيان العلاج السريري يتبدل بخارجة السريري فقط بعد فطرية سلبية و هذا لا الأظفار الصحية تستغرق وقتاً طويلاً.
• الفطريات التي تصيب الجلد الأمر، داء المبيضات الجلدية، من أسبوعين إلى

Talis® 250 mg

Terbinafine
Scored tablets

1. WHAT TALLIS 250 mg scored tablet AND WHEN IS IT USED?

Composition:
Actif ingredient terbinafine 250 mg (as terbinafine hydrochloride 281.25 mg)
Excipients: magnesium stearate, anhydrous colloidal silica, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, hypromellose ... s.q.f. 1 tablet.

Pharmaceutical form: Scored tablet.
Pharmaco therapeutic class: Oral antifungal agent.
(Code ATC: D01BA2 ; D : dermatology)

Therapeutic indication
This medication is indicated to treat certain fungi infections of skin and nails:
• Onychomycosis.
• Cutaneous dermatophytosis (including glabrous skin tinea, palmoplantar keratodermias, plantar interdigital intertrigo).
• Cutaneous candidiasis.

When these two previous infections cannot be treated locally, due to extended lesions or to usual antifungal resistance treatments. Orally administered terbinafine tablets are not effective against Pityriasis versicolor and vagina candidiasis.

2. WHAT INFORMATION TO KNOW BEFORE USING TALLIS 250 mg scored tablet ?

Contra-indications
Do not take TALLIS 250 mg scored tablet:
• If you are allergic to terbinafine or any of the excipients;
• If you have severe liver disease.
• If you have severe kidney disease.
• If you have had a rash of pustules with whitish skin rashes and fever as a result of treatment with TALLIS.

Precautions, special warnings
Take special care with TALLIS 250 mg scored tablet:
Tell your doctor if you have or have ever had one of the situations described below.
Stop taking them immediately and consult a doctor as soon as possible or an emergency service if you develop any of the following symptoms: itching, fatigue can be significant, persistent nausea, vomiting, pain under the ribs on the right, decreased appetite, dark urine, clay-colored stools, jaundice, fever, sore throat. Before starting treatment with TALLIS and regularly during treatment, your doctor may order blood tests to monitor your liver function. He will ask you have to stop treatment in case of abnormal results.
Serious skin reactions have been seen by terbinafine. Stop taking them immediately and consult a doctor if you have peeling skin, blisters on the membranes in the mouth, eyes and lips extending quickly, buttons with pus red skin, fever (signs that may indicate a serious reaction to the skin), rash on the skin due to an increase in a certain type of white blood cells (eosinophils).
• Tell your doctor if you have extensive psoriasis or lupus erythematosus (a skin condition linked to an abnormality of the immune system).

• If you have tiredness, unusual bleeding, bruising or frequent infections, stop your treatment and consult a doctor.
In rare cases, this medicine can cause impairment or loss of taste (taste reappear once treatment stopped). It is not recommended to use this medicine if you use the taste for professional use.
Tell your doctor before taking this medicine if you have liver disease. Some severe cases of hepatic failure have been reported with terbinafine. Your doctor may prescribe analyzes.
• Tell your doctor before taking this medicine if you have psoriasis or lupus erythematosus (a skin disease linked to an abnormality of the immune system).
• Tell your doctor before taking this medicine if you have kidney disease because this drug is not recommended. It is not recommended to use this medicine for a child.

Interactions with other medicines
Do not take TALLIS 250 mg scored tablet if you take:
• A medication used to treat deficit attention deficit disorder / hyperactivity disorder (atomoxetine).
• A drug used to treat certain allergies (meguizatine).
• A medication used in the treatment of certain breast cancer (tamoxifen).
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

Pregnancy
It is better do not use this drug during pregnancy, unless your doctor has decided otherwise.
If you discover you are pregnant during treatment, consult your doctor who is the only person who can judge whether the drug should be continued.
Ask your doctor or pharmacist before taking any medicine.

Breastfeeding
This drug is not recommended if breastfeeding, unless your doctor has decided otherwise.
Ask your doctor or pharmacist before taking any medicine.
Effects on ability to drive and use machines
You should avoid driving or operating machinery if you feel dizzy.

3. HOW TO TAKE TALLIS 250 mg scored tablet ?

Posology
In general, strictly comply with your doctor's prescription.
One tablet per day.
The duration of treatment depends on the type-site of the infection.
• Onychomycosis:
Treatment duration is usually between 6 weeks to 3 months.
• Onychomycosis of hands : a treatment period of 6 weeks is sufficient for most cases.
• Onychomycosis of the feet : a treatment period of 12 weeks is sufficient for most cases. In some patients with slower nail growth, a longer duration of treatment may be necessary. It is common for clinical cure to occur only a few months after negative mycological results. This is because the healthy nail takes time to regrow.
• Tinea of glabrous skin, or cutaneous candidiasis: 2 to 4 weeks.
• Intertrigo toes (interdigital type, plantar/moccasin): 2-6 weeks.
Mode and route of administration
Oral route.
To be taken preferably with meals.
If you forget to take TALLIS 250 mg scored tablet:

